

Poecilia vittata - Szalagos límia

ELSŐ LEÍRÓJA:	Guichenot, 1853
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	5-10 cm
C°:	23-26
pH°:	6-8
Nk°:	8-20
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Poecilia vittata

Szalagos límia

(Guichenot, 1853)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Poecilia vittata – Szalagos límia elterjedési területe (Map)



Kuba kisebb édes- és félsós vizeiben élő, először
1913-ban Európába hozott, a többi límiánál
zömökebb testű faj.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hím elérheti a 6,5, a nőstény a 10 cm hosszúságot. Az alapszíne sárga, ami a hastájékon rózsaszínbe mehet át. Mindkét ivar ráeső fényben kékesen ragyog. A test oldalán egy jellegtelen, sötét, hosszanti szalag és több keskeny, fekete keresztsáv látható amelyek főleg a faroknyélen szembeötlőek. A hát- és a farokúszó színe a citromsárgától a narancspirosig terjedhet, rajtuk sok fekete, szabálytalan alakú folt, s gyakran sötét szegéllyel. A nőstényen a keresztsávok hiányoznak; hát- és farok alatti úszói csupán sárgás

színűek, kevés kis sötét ponttal.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés természetű és hőigényes, mint mindegyik límia faj. A többinél kevésbé érzékeny a vízváltozásokra és a hőmérséklet-csökkenésre (20 °C-ig). Általában 23-26 °C hőhatárok közt tartjuk. Kezdőknek is ajánlható, könnyen tartható, mutatós kis eleven szűlő, ami félénknek sem nevezhető. A sűrű növényzetet viszont kedveli, jól érzi magát a levelek közt fickándozva. Persze a részleges vízcserékről ne feledkezzünk meg, és lehetőleg a szűrés is egy átlagos körülmények mellett elvárható erősségű legyen. Kitűnően társítható, az egészen apró kis razbórákkal, lazacokkal, de a közepesebb márnákkal, harcsákkal, stb. is jól kijön, társasági hal. Megfelelő körülmények között tündöklő kis eleven szűlő csapatot gondozhatunk. Az állati élő eseményeken kívül jó minőségű tápok és friss növényi anyagokat is adjunk neki. A száraz műeseményeket is elfogadja, de vitalitása szempontjából a kiegészítő tápok is fontosak.

Nagyon termékeny faj. A nagyobb nőstény egy-egy alkalommal akár 100 ivadékot is szülhetnek. Érdemes szülőketrevezni, így az ivadékok jó része eredményteljesen megmarad. Változatos eledeleken nevelve, kellő hely esetén és persze rendszeres kis részleges vízcserék mellett nagyon szép állományt kaphat a lelkes tenyésztő.

Sajnos nemhogy idehaza, még Európában sem olyannyira gyakori, ahogy megérdemelné, gyakran ára is elég magas.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

kubai límia

syn: *Limia cubensis*, *Limia pavonina*, *Limia vittata*.

Eng: Banded limia, Cuban Limia, Cuban molly, Cuban topminnow.

Egyéb köznevei: Cuba-límia, Sahalímia, Sahamolli, Bänderkärpfling, Kuba-Límia, Kubakärpfling, Schwarzsau m-Kärpfling, Tabai, Fanguillo, Bandlímia.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Eleven szűlő fogas pontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Guichenot](#), [akvarisztika](#), [Poecilia vittata](#), [Poeciliidae](#), [Szalagos límia](#), [Eleven szűlő fogas pontyok](#), [1853](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Amerika](#), [mindenevő](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Közép-Amerika](#), [középső szint](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [trópusi](#), [felső szint](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [békés viselkedés](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-13 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 12:09:43

Katalógus ID: 3911

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/poecilia-vittata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva